

QUAND LES RESULTATS SERONT-ILS DISPONIBLES ?

Le résultat de la cytoponction nécessite une analyse spécialisée. Il est communiqué au médecin ayant prescrit le prélèvement, dans un délai de deux à trois semaines. Vous pourrez alors le revoir pour faire le point avec lui.

LES RISQUES LIES A LA CYTOPONCTION THYROÏDIENNE

Tout acte médical sur le corps humain comporte un risque de complication.

→ Vous ressentirez peut-être une sensation de tension dans le cou mais qui ne doit pas excéder quelques heures.

L'arrêt d'un éventuel traitement anticoagulant, la finesse des aiguilles utilisées et la compression après ponction sont généralement suffisants pour éviter la survenue d'un hématome.

→ Cependant, vous pouvez constater un gonflement du cou. Cela disparaîtra spontanément.

Vous pouvez nous joindre
pour toute(s) question(s)

 8h à 18h

 04.90.27.62.95



*Ce document a été créé par les
professionnels du service d'imagerie.*

INSTITUT SAINTE CATHERINE
250 CHEMIN DE BAIGNE-PIEDS CS 80005
84918 AVIGNON CEDEX 9
Tél. 04.90.27.61.61

Service Mammographie :
04.90.27.62.95 / 04.90.27.60.08



INFORMATION PATIENT

QU'EST-CE QU'UNE

CYTOPONCTION

THYROÏDIENNE ?

QU'EST-CE QU'UNE CYTOPONCTION THYROÏDIENNE ?

La cytoponction thyroïdienne est un geste simple et bien toléré qui consiste à introduire une aiguille très fine à travers la peau jusqu'à l'anomalie détectée par le médecin pour recueillir des cellules. Ce geste est réalisé sous contrôle échographique.



Les cellules recueillies sont ensuite analysées au microscope par un médecin spécialisé appelé anatomopathologiste. La cytoponction permet d'apprécier la nature bénigne ou maligne de l'anomalie et d'éviter le cas échéant une intervention chirurgicale.

COMMENT SE DEROULE L'EXAMEN ?

- Vous êtes allongé(e) sur la table d'examen.
- Le médecin repère la zone à ponctionner et le trajet de l'aiguille à l'aide de la sonde d'échographie.
- La zone de ponction est désinfectée.
- Le médecin suit la mise en place de l'aiguille sous contrôle échographique.
- Trois ou quatre prélèvements sont généralement nécessaires.
- Les prélèvements terminés, un petit pansement est placé sur le point de ponction, à conserver quelques heures.
- La cytoponction dure environ 25 minutes.

EST-CE DOULOUREUX ?

Réalisée à l'aide d'aiguilles fines, la cytoponction thyroïdienne effectuée en ambulatoire est peu douloureuse. La gêne ressentie est comparable à celle d'une prise de sang. Elle ne nécessite pas d'anesthésie locale.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Avant la cytoponction, veiller à :

- ne pas prendre d'aspirine (ni ses dérivés) dans les 8 jours précédant la cytoponction,
- en accord avec le médecin traitant, arrêter tout traitement anticoagulant avant la cytoponction,
- signaler une éventuelle allergie au latex,
- aucune préparation particulière n'est nécessaire.

Après la cytoponction, veiller à :

- rester assis(e) quelques minutes avant de vous lever,
- attendre en salle d'attente jusqu'à ce que l'on vous laisse partir (environ 10 minutes),
- en cas de douleur après la ponction (très rare), vous pouvez prendre du paracétamol si nécessaire mais pas d'aspirine (ni ses dérivés).